

CHALLENGE®

Erbicida selettivo per carota, pisello, cece, lenticchia, lupino, fava, favino, pomodoro, peperone, mais, patata, girasole, sorgo, tabacco, aglio, cipolla, scalogno, finocchio, carciofo.

Sospensione Concentrata (SC)

Meccanismo d'azione: Gruppo HRAC/WSSA 32 (già gruppo HRAC F3)

CHALLENGE®

Composizione:

g 100 di prodotto contengono:
Aclonifen puro 49,6 g (= 600 g/l)
Coformulanti q.b. a 100

Indicazioni di pericolo

H351 Sospettato di provocare il cancro.

H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

EUH208 Contiene aclonifen, 1,2 benzisothiazolin-3-one. Può provocare una reazione allergica.

Consigli di prudenza

P101 In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.

P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini.

P201 Procurarsi le istruzioni prima dell'uso.

P273 Non disperdere nell'ambiente.

P280 Indossare guanti/indumenti protettivi / Proteggere gli occhi/il viso.

P308 + P313 IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.

P332 + P313 In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.

P391 Raccogliere la fuoriuscita.

P501 Smaltire il contenuto/recipiente in conformità alla regolamentazione nazionale.

Titolare dell'Autorizzazione: Bayer CropScience S.r.l. – Viale Certosa 130 – 20156 Milano – Tel. 02/3972.1

Officine di produzione e confezionamento:

Bayer S.A.S. - Villefranche (Francia); Bayer AG – Industriepark Hoechst - Francoforte (Germania);

Bayer CropScience LP – Kansas City (USA); Arysta Lifesciences S.A.S. – Nogueres (Francia)

Phyteurop S.A. – Montreuil-Bellay (Francia); Schirm GmbH – Wolfenbüttel (Germania);

Schirm GmbH – Schönebeck, Elbe (Germania); Cheminova Deutschland GmbH & Co.KG – Stade (Germania)

Officine di confezionamento: Bayer S.A.S – Marle-sur-Serre (Francia); Bayer CropScience S.r.l. – Filago (BG)

Registrazione n. 8184 Ministero della Sanità del 16/03/93

Contenuto netto : 1 - 5 – 10 L

Partita n.:



ATTENZIONE

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI

Durante le fasi di miscelazione, carico e applicazione del prodotto adoperare indumenti e guanti adatti. Non rientrare nei campi trattati prima che i depositi sulla superficie fogliare siano completamente asciugati. Per l'impiego su pomodoro in post-trapianto, durante le attività in campo successive al trattamento indossare guanti adatti.

Per proteggere gli organismi acquatici deve essere presente una fascia di rispetto dai corpi idrici superficiali di:

-10 metri per carota, carciofo, pomodoro, peperone, pisello, cece, lenticchia, lupino, girasole, sorgo, tabacco e per i trattamenti di post-emergenza precoce di cipolla, aglio e scalogno.

- 20 metri o in alternativa 10 metri con l'utilizzo di ugelli che riducano la deriva del 50% per fava, favino, patata, finocchio.

- 5 metri per mais. Non applicare in aree con pendenza superiore al 4 % in assenza di misure di riduzione del 90% del ruscellamento.

Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso. **Consultare un Centro Antiveleni**

CARATTERISTICHE

Erbicida impiegabile in trattamenti di pieno campo in pre-emergenza e in post emergenza precoce. In pre-emergenza il prodotto è assorbito dalle infestanti in fase di germinazione attraverso l'ipocotile e i cotiledoni. In post emergenza precoce il prodotto è assorbito dai cotiledoni e dalle prime foglie delle piante in germinazione. Il prodotto è attivo prevalentemente su infestanti dicotiledoni.

INFESTANTI SENSIBILI :

Amaranto comune (*Amaranthus retroflexus*), Anagallide rossa (*Anagallis arvensis*), Camomilla bastarda (*Anthemis arvensis*), Borsa del pastore (*Capsella bursa pastoris*), Farinello comune (*Chenopodium album*), Lappolina (*Coronopus didymus*), Erba sofia (*Descurainia sophia*), Ruchetta violacea (*Diploaxis erucoides*), Attaccamani (*Galium aparine*), Erba Ruota (*Lamium amplexicaule*), Falsa ortica (*Lamium purpureum*), Camomilla comune (*Matricaria chamomilla*), Papavero (*Papaver rhoeas*), Persicaria (*Polygonum persicaria*), Erba Calderina (*Senecio vulgaris*), Senape (*Sinapis arvensis*), Centocchio (*Stellaria Media*), Crespino dei campi (*Sonchus arvensis*), Crespino liscio (*Sonchus oleraceus*), Veronica ederifoglia (*Veronica hederifolia*).

INFESTANTI MEDIAMENTE SENSIBILI

Cencio molle (*Abutilon theophrasti*), Correggiola (*Polygonum aviculare*), Convolvolo nero (*Polygonum convolvulus*).

MODALITA' D'IMPIEGO

DOSI D'IMPIEGO ED EPOCA DI IMPIEGO

carota, pomodoro seminato	2,5 - 3 L/ha	pre emergenza (subito dopo la semina)
pisello, fava, cece, lupino, lenticchia, favino	2,5 - 3 L/ha	pre emergenza
patata	2,5 - 3 L/ha	pre-emergenza (dopo semina oppure dopo la rincalzatura)
tabacco	2,5 - 3 L/ha	pre trapianto
pomodoro	2,5 - 3 L/ha	pre trapianto
	0,6-0,75 L/ha	post trapianto - 2 trattamenti da effettuarsi a partire da 2 foglie a inizio fioritura (BBCH 12-51) con un intervallo tra le applicazioni di 7-10 giorni. I trattamenti in post-trapianto sono alternativi al trattamento in pre-emergenza/pre-trapianto
peperone	2,0 L/ha	pre trapianto
carciofo (carducci, ovoli e piantine)	2,0 L/ha	pre-trapianto o pre-emergenza
finocchio	2,0 L/ha	pre-emergenza o pre-trapianto
girasole	2,5 - 3 L/ha	in pre-emergenza subito dopo la semina della coltura
cipolla, aglio, scalogno	1 – 1,25 L/ha	in post-emergenza precoce (2- 4 foglie vere)
mais	1,5 - 2 L/ha	in pre emergenza (subito dopo la semina)
sorgo	1 - 1,5 L/ha	in pre emergenza (subito dopo la semina)

Su mais e sorgo impiegare la dose più bassa su terreni leggeri. In post emergenza precoce impiegare la dose più bassa in presenza di infestanti allo stadio cotiledonare.

VOLUME D'IRRORAZIONE: 300 - 500 L/ha.

VOLUME D'IRRORAZIONE PER IL POMODORO IN POST-TRAPIANTO: 250-300 L/ha.

Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

AVVERTENZE

- Nei terreni limosi piogge battenti di forte intensità e ristagni d'acqua possono sensibilizzare le colture in fase di emergenza.
- Su pomodoro seminato, con andamento stagionale molto piovoso e freddo dopo le semine, il prodotto può manifestare interazioni fitotossiche con geoinsetticidi a base di chlorpyrifos localizzati a contatto con il seme.
- Su carota utilizzare la dose inferiore prevista, qualora le temperature superino i 30 °C.
- Impiegare il prodotto in condizioni di assenza di vento
- Non impiegare sui mais da seme, mais dolce e da "pop-corn".
- In caso di forzata sostituzione della coltura diserbata è possibile la risemina o il trapianto della coltura stessa, previa lavorazione superficiale a 8 cm.

GESTIONE DELLA RESISTENZA

Allo scopo di evitare o ritardare la comparsa e la diffusione di malerbe resistenti, si consiglia di alternare all'erbicida prodotti aventi un differente meccanismo d'azione e di adottare idonee pratiche agronomiche, quali ad esempio la rotazione colturale e la falsa semina. Monitorare con attenzione la presenza di malerbe sensibili sfuggite ai trattamenti ed informare il rivenditore e le autorità competenti (Servizio fitosanitario regionale di pertinenza) in caso di sospetta resistenza.

FITOTOSSICITÀ

Nelle colture per le quali è autorizzato l'impiego del prodotto solo in pre-emergenza, non intervenire dopo l'inizio dell'emergenza.

ATTENZIONE

Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Non applicare con i mezzi aerei.

Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso.

Operare in assenza di vento.

Da non vendersi sfuso.

Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti.

Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.

Il contenitore non può essere riutilizzato.



® Marchio registrato Gruppo Bayer

www.cropscience.bayer.it

20.05.26