



Edizione 2020
Soluzioni per la difesa
Cucurbitacee



IL NOSTRO IMPEGNO PER L'ORTICOLTURA ITALIANA.

L'orticoltura è un raggruppamento colturale di grande importanza per il nostro paese e strategico per l'intera economia agricola nazionale. L'Italia deve crederci per mantenere la propria posizione di produttore ed esportatore storico di ortaggi freschi e trasformati di qualità. Anche noi di Bayer CropScience vogliamo diventare leader in questo settore e abbiamo deciso di investire per dare ad ogni orticoltore moderno risposte concrete alle molteplici richieste dei mercati in cui opera. La stretta collaborazione tra Bayer CropScience e Bayer Seminis, entrambe protagoniste competenti nella propria area di business, evidenzia l'impegno della Società nel dare **soluzioni di valore per l'orticoltura italiana**.

- **Prodotti innovativi** sviluppati in modo specifico per l'orticoltura, in grado di risolvere in modo semplice e rapido la gran parte dei problemi tecnici.
- **Prodotti di origine naturale**, efficaci e capaci di offrire risultati soddisfacenti per gli agricoltori che vogliono andare oltre l'efficacia.
- **Soluzioni integrate** che riuniscono agrofarmaci tradizionali, prodotti biologici e sementi di qualità, per soddisfare le richieste della filiera orticola.
- **Una rete di specialisti** in orticoltura, tecnicamente preparati e capaci di dare risposte concrete in tempi rapidi.



SOLUZIONI PER LA DIFESA

Cucurbitacee

Ma non solo: per facilitare il dialogo tra il mondo produttivo e quello della ricerca, dell'industria e della distribuzione e per dare voce ai protagonisti dell'agricoltura vera, Bayer sostiene l'iniziativa di comunicazione *Coltura&Cultura*.

www.colturaecultura.it

PARASSITI



Afidi

IL PROBLEMA

Molteplici sono le specie che possono danneggiare le coltivazioni di melone, anguria, zucchino e altre cucurbitacee: *Myzus persicae*, *Macrosiphum euphorbiae*, *Aphis fabae* e *Aphis gossypii* sono tra i più diffusi e pericolosi.

Questi sono fitofagi di primaria importanza e oltre a determinare danni diretti sono pericolosi vettori di virus.

I loro cicli biologici sono diversi e complessi, correlati al loro polimorfismo e alla specificità di colonizzazione delle piante.

LA SOLUZIONE

Occorre impostare la difesa nel migliore dei modi, impiegando sia prodotti abbattenti che prodotti sistemici (in grado di raggiungere l'interno della pianta), evitando prontamente lo sviluppo dei parassiti.

Se possibile utilizzare prodotti con spettro d'azione ampio, in modo tale da controllare anche altri parassiti.



250 ml
1 L
5 L

Quando: applicare il prodotto all'inizio dell'attacco per sfruttare in modo ottimale l'attività abbattente.

Dose: 0,3-0,5 L/ha



250 ml
1 L

Quando: ad inizio infestazione.

Dose: 60-75 ml/hl



1 L
5 L

Quando: alla comparsa dei primi individui per avere controllo a lungo e proteggere anche le parti più nascoste, grazie alla sua duplice sistemica.

Dose: 1,25-1,5 L/ha



5 L

Quando: ad inizio infestazione.

Dose: 1 L/hl



5 L

Quando: può essere applicato in tutti gli stadi vegetativi, assicurando un'adeguata bagnatura.

Dose: 0,4-0,65 L/hl

Avvertenze: solo per uso in serra contro afidi, aleurodidi, tripidi.

PARASSITI



Aleurodidi

IL PROBLEMA

Sono spesso noti come "mosche bianche", per via del rivestimento di secrezioni ceroso bianche e polverulente; rappresentano una delle avversità più diffuse in serra e contemporaneamente difficili da controllare.

Tra le specie più dannose riscontrate su cucurbitacee in coltura protetta possono essere menzionate *Trialeurodes vaporariorum* e *Bemisia tabaci*.

Oltre a sottrarre linfa, fondamentale per lo sviluppo vegetativo della pianta, l'attività trofica degli aleurodidi determina una significativa produzione di fumaggine, in grado di deprezzare le produzioni.

Non trascurabile è la loro capacità di fungere da vettori di virus.

LA SOLUZIONE

Vivono principalmente sulla pagina inferiore delle foglie; traggono il loro nutrimento dalla linfa che assorbono tramite l'apparato boccale succhiatore, inserito nei vasi conduttori.

Per questo motivo è importante impiegare prodotti sistemici, in grado di muoversi nei vasi linfatici internamente ai tessuti.



500 ml

Quando: alla comparsa degli stadi giovanili. Se necessario, ripetere dopo almeno 10 giorni.

Dose: 0,6-0,9 L/ha



250 ml
1 L

Quando: ad inizio infestazione, ripetendo l'applicazione dopo 10 giorni se necessario.

Dose: 75 ml/hl



1 L
5 L

Quando: alla comparsa dei primi individui per avere controllo a lungo e proteggere anche le parti più nascoste, grazie alla sua duplice sistemica.

Dose: 1,25-1,5 L/ha



5 L

Quando: ad inizio infestazione.

Dose: 1 L/hl



5 L

Quando: può essere applicato in tutti gli stadi vegetativi, assicurando un'adeguata bagnatura.

Dose: 0,4-0,65 L/hl

Avvertenze: solo per uso in serra contro afidi, aleurodidi, tripidi.

PARASSITI



Nottue fogliari

IL PROBLEMA

Spodoptera armigera, *Spodoptera exigua*, *Helicoverpa armigera* sono lepidotteri altamente polifagi la cui attività alimentare determina notevoli danni a tutti gli organi della pianta, inclusi i giovani frutti che vengono erosi oppure perforati.

LA SOLUZIONE

Monitorare sempre il volo del lepidottero attraverso le trappole adeguate e intervenire alla primissima comparsa degli individui.



250 ml
1 L
5 L

Quando: applicare il prodotto all'inizio dell'attacco per sfruttare in modo ottimale l'attività abbattente.

Dose: 0,3-0,5 L/ha

PARASSITI



Nottue terricole

IL PROBLEMA

Le nottue terricole (*Agrotis ipsilon* e *Agrotis segetum*) si sviluppano negli strati superficiali del terreno erodendo le piante.

Le femmine, capaci di notevoli migrazioni, preferiscono terreni freschi, umidi e ricchi di vegetazione per la deposizione delle uova.

Lo sviluppo di infestazioni improvvise non è cosa rara.

LA SOLUZIONE

La difesa deve essere impostata in modo preventivo, impiegando dapprima un geo-insetticida ad ampio spettro di azione e completando poi il controllo con i trattamenti successivi.



250 ml
1 L
5 L

Quando: applicare il prodotto all'inizio dell'attacco per sfruttare in modo ottimale l'attività abbattente.

Dose: 0,3-0,5 L/ha

PARASSITI



Acari tetranichidi

IL PROBLEMA

Chiamato comunemente ragnetto rosso, *Tetranychus urticae* è un parassita ad elevata polifagia.

La sua velocità di sviluppo aumenta con l'incremento della temperatura e le generazioni in serra possono susseguirsi in modo continuo, fino a raggiungere anche le 30 generazioni annue.

LA SOLUZIONE

Le infezioni più precoci sono anche le più dannose. Intervenire subito con prodotti a lunga durata di azione.

Occorre ricordarsi di alternare prodotti a differente meccanismo di azione, per evitare l'instaurarsi di popolazioni resistenti.

oberon

500 ml

Quando: alla comparsa degli stadi giovanili. Se necessario, ripetere dopo almeno 10 giorni.

Dose: 0,45-0,9 L/ha

Avvertenze: impiego possibile solo in serra.

FLIPPER

5 L

Quando: ad inizio infestazione.

Dose: 1 L/ha

REQUIEM

5 L

Quando: applicabile in tutti gli stadi vegetativi con intervallo minimo di 7 giorni.

Dose: 0,4-0,65 L/ha

Avvertenze: impiego solo in serra.

Focus on

INSETTI UTILI E IMPOLLINATORI

In serra molto spesso vengono impiegati insetti sia per garantire un'adeguata impollinazione dei fiori sia per migliorare il controllo di alcuni insetti parassiti. Il loro rispetto è essenziale e per questo motivo l'impiego di prodotti che ne garantiscano la miglior selettività è fondamentale. Oberon rispetta sia gli impollinatori sia i predatori/parassitoidi di molti insetti e il suo impiego è compatibile con le moderne tecniche di protezione integrata.

PARASSITI



Tripidi

IL PROBLEMA

Sono diverse le specie di tripidi che attaccano le principali cucurbitacee ma i principali sono senza dubbio *Frankliniella occidentalis* e *Thrips tabaci*.

Il danno non è solo determinato dalla puntura dei tessuti vegetali (foglie, fiori, frutti) con conseguente svuotamento delle cellule vegetali ma anche dal fatto di essere temibili vettori di virus.

Gli organi vegetali preferiti per l'alimentazione sono le strutture fiorali, dove questi parassiti determinano l'aborto dei fiori con conseguente disseccamento e caduta.

LA SOLUZIONE

Il controllo dei tripidi non è assolutamente facile proprio perché annidandosi nelle parti interne fiorali non sono facilmente raggiungibili dagli insetticidi.

Il controllo delle specie vegetali limitrofe può essere un valido mezzo, non solo per contenere la popolazione ma anche per limitare il passaggio di virus tra ospiti differenti.

decis evo

250 ml
1 L
5 L

Quando: applicare il prodotto all'inizio dell'attacco per sfruttare in modo ottimale l'attività abbattente.

Dose: 0,3-0,5 L/ha

FLIPPER

5 L

Quando: ad inizio infestazione.

Dose: 1 L/ha

REQUIEM

5 L

Quando: applicabile in tutti gli stadi vegetativi con intervallo minimo di 7 giorni.

Dose: 0,4-0,65 L/ha

Avvertenze: impiego solo in serra.



Nematodi galligeni

IL PROBLEMA


Appartenenti al genere *Meloidogyne*, i nematodi sono organismi di aspetto vermiforme comunemente presenti nei terreni; l'aggettivo "galligeni" è stato loro attribuito per via dei caratteristici ingrossamenti o noduli, che si formano sulle radici a seguito dell'insediamento del parassita.

Le specie sono molteplici ma quelle più dannose sono *M. Incognita*, *M. Hapla*, *M. Javanica*.

LA SOLUZIONE

Il danno non si limita alle radici ma determina un calo produttivo della pianta, che facilmente supera il 20-30%. Intervenire con prodotti nematocidi prima del trapianto della coltura e proseguire poi nella difesa subito dopo il trapianto e se necessario durante lo sviluppo della pianta.

Migliorare il drenaggio delle acque; l'esecuzione di lavorazioni estive, così come la solarizzazione stessa possono apportare un abbattimento della popolazione.



VELUM
PRIME

0,5 L

Quando: trattare 1-3 giorni dopo il trapianto e ripetere l'applicazione 15-30 giorni dopo il trapianto *oppure* trattare 1-3 giorni prima del trapianto e ripetere l'applicazione 15-30 giorni dopo il trapianto.

Dove: 0,625 L/ha per ogni singola applicazione.

applicazione: tramite manichetta dell'impianto di fertirrigazione.

Avvertenze: è possibile effettuare al massimo due applicazioni annue in serra e una in pieno campo.

Il controllo sostenibile dei nematodi galligeni

Media infestazione – Esempio cocomero



Focus on

I VANTAGGI DI VELUM PRIME

- Nematocida ad azione rapida ed efficace
- Controllo contemporaneo e duraturo dell'Oidio
- Applicazione semplice e diretta da parte dell'orticoltore
- Flessibile nell'impiego, per integrarsi ai vari programmi di difesa
- Profilo tossicologico e ambientale favorevole.

ESEMPIO DI DIFESA INTEGRATA CONTRO I NEMATODI

Effettuare 1 applicazione di Bioact Prime DC in pre-trapianto alla dose di 0,75 L/ha; impiegare quindi Velum Prime alla dose di 0,625 L/ha 1-3 giorni dal post-trapianto o 1-3 giorni prima del trapianto. Proseguire con 2-3 applicazioni di Bioact Prime in fase di sviluppo vegetativo alla dose di 0,75 L/ha.

MALATTIE



Peronospora

IL PROBLEMA

Pseudoperonospora cubensis, agente della malattia, colpisce tutte le cucurbitacee; sulle foglie si ha la comparsa di macchie irregolari che con l'avanzare della malattia assumono colore marrone, arrivando fino al disseccamento.

LA SOLUZIONE

I fattori climatici che facilitano la malattia sono temperature miti e valori elevati di umidità relativa.

I trattamenti dovrebbero iniziare già come preventivi ma quando si identificano queste condizioni occorre porre più attenzione e trattare con i prodotti antiperonosporici migliori, impiegando le dosi di etichetta più alte e gli intervalli tra i trattamenti più corti.



Quando: eseguire sempre trattamenti preventivi con intervallo tra le applicazioni di 8-12 giorni, in funzione della potenziale pressione della malattia.

Dose: 1,4-1,6 L/ha



Quando: Alle prime bagnature infettanti, interventi preventivi ogni 8-10 giorni.

Dose: 200-300 g/hl



Quando: effettuare 2 trattamenti preventivi a distanza di 7-10 giorni.

Dose: 120-165 g/hl



MALATTIE



Batteriosi

IL PROBLEMA

Negli ultimi anni le malattie batteriche sono risultate essere sempre più presenti sul territorio nazionale, talvolta in maniera sporadica ma distruttiva e con notevoli perdite produttive.

Sono molteplici gli agenti batterici infettanti; tra questi ricordiamo le specie appartenenti ai generi *Pseudomonas* e *Xanthomonas*.

LA SOLUZIONE

L'impiego di seme certificato o di materiale vivaistico sano rappresentano il modo più efficace per ridurre l'inoculo. Anche adeguate rotazioni possono in gran parte dei casi ridurre la problematica.

Infine, l'impiego di mezzi chimici di difesa basati su prodotti contenenti rame possono tenere sotto controllo lo sviluppo delle malattie batteriche.



Quando: effettuare 2 trattamenti preventivi a distanza di 7-10 giorni.

Dose: 1,7-2,8 kg/ha



Quando: eseguire i trattamenti preventivi ogni 8-10 giorni, in funzione della pressione della malattia.

Dose: 4-5 kg/ha



MALATTIE

Oidio

IL PROBLEMA

Le foglie colpite da oidio o mal bianco mostrano un feltro di colore biancastro molto caratteristico. Diverse sono le specie ma le più comuni e frequenti sono *Sphaerotheca fuliginea* ed *Erysiphe cichoracearum*.

Il fungo penetra nella foglia attraverso gli stomi, sviluppandosi nei tessuti interni. Esternamente la malattia determina il disseccamento dell'intera foglia.

LA SOLUZIONE

Intervenire preventivamente ricordandosi di alternare prodotti con differente meccanismo d'azione.

**FLINT MAX**

500 g

Quando: eseguire i trattamenti preventivi ogni 8-12 giorni.

Dose: 300 g/ha

SONATA

5 L

Quando: dallo stadio di sviluppo delle foglie fino a raccolta.

Dose: 5-10 L/ha



Botrite

IL PROBLEMA

Principalmente dannoso sotto serra, *Botrytis cinerea* può arrecare gravi perdite di produzione.

La penetrazione del fungo può avvenire direttamente oppure indirettamente, attraverso ferite derivanti da agenti atmosferici, altri funghi oppure lesioni determinate da insetti.

LA SOLUZIONE

Climi freschi e umidità elevata favoriscono lo sviluppo delle infezioni. Una corretta gestione dell'aerazione delle serre e un'adeguata gestione del sesto di impianto possono ridurre le condizioni predisponenti.

Unitamente a queste, una corretta difesa impostata in modo preventivo può determinare un controllo ottimale della botrite.

TELDOR plus1 L
5 L

Quando: eseguire i trattamenti al manifestarsi delle condizioni infettanti.

Dose: 1-1,5 L/ha

Nota: su cetriolo in serra è possibile alternare con Serenade ASO

MALATTIE

Marciumi del colletto

IL PROBLEMA

Gli agenti infettanti che inducono questa patologia appartengono al genere *Pythium* e fanno parte del grande raggruppamento degli oomiceti.

Trovano le migliori condizioni per il loro sviluppo nei vivaai, dove invadono in modo aggressivo i tessuti del colletto causandone la necrosi; le piantine si piegano sul terreno e muoiono.

Le infezioni si propagano in modo veloce e determinano la moria delle piantine a macchia d'olio. Questi attacchi sono maggiormente frequenti nelle prime due settimane dopo l'emergenza.

LA SOLUZIONE

L'eccessiva densità di semina è un fattore che accentua notevolmente il rischio di danni dovuti a queste malattie, che riescono a conservarsi nel suolo sotto forma di clamidospore.

T trattare già in semenzaio, dalla semina al pre-trapianto, impiegando prodotti a meccanismo di azione multiplo per evitare fenomeni di assuefazione degli agenti infettanti.

**PREVICUR ENERGY**1 L
5 L

Quando: eseguire i trattamenti in pre o post-trapianto.

Dose:

- in vivaio eseguire applicazioni in pre-trapianto a 3 ml/mq utilizzando 2-4 L di acqua/mq
- in pieno campo o in serra intervenire con applicazioni localizzate al terreno o con impianti a goccia alla dose di 2-3 L/ha

note: applicato nelle prime fasi di sviluppo in pieno campo e/o in serra, Previcur Energy manifesta una importante azione collaterale nel controllo della peronospora (*Pseudoperonospora cubensis*).

Focus on

PREVICUR ENERGY

Previcur Energy contiene propamocarb e fosetil, associazione dei due principi attivi che ne garantisce un'ottimale solubilità, non possibile con la miscela dei singoli principi attivi diversamente formulati. Applicare Previcur Energy nel terreno o in semenzaio permette un controllo ottimale di *Pythium* e di altre malattie del terreno; potenzia i sistemi di difesa normalmente presenti nelle piante e comporta un miglior sviluppo vegetativo dell'apparato aereo e radicale.

Elenco colture autorizzate

ALIETTE è autorizzato su: melone, anguria, cetriolo

BIOACT PRIME DC è autorizzato su: cetriolo, cetriolino, zucchini, zucca, anguria, melone

CONTANS WG è autorizzato su: melone, anguria, cetriolo, zucchini, cetriolino, zucca

CUPRAVIT BIO ADVANCED è autorizzato su: melone, anguria, cetriolo, zucchini, cetriolino, zucca

CUPRAVIT BLU 35 WG è autorizzato su: melone, anguria, cetriolo, zucchini, cetriolino, zucca

CUPRAVIT 35 WG è autorizzato su: melone, anguria, cetriolo, zucchini, cetriolino, zucca

DECIS EVO è autorizzato su: cetriolo, cetriolino, zucchini, melone, anguria, zucca

FLINT è autorizzato su: melone, anguria, cetriolo, zucchini, zucca

FLINT MAX è autorizzato su: melone, anguria, cetriolo, zucchini, zucca

FLIPPER è autorizzato su: cetriolo, cetriolino, zucchini, zucca, anguria, melone

FOLICUR COMBI WG è autorizzato su: melone, anguria, cetriolo, zucchini, zucca

FOLICUR WG è autorizzato su: melone, anguria, cetriolo, zucchini, zucca

MOVENTO è autorizzato su: anguria, melone, cetriolo e zucchini

OBERON è autorizzato su: cetriolo, zucchini, zucca, anguria, melone (solo serra)

PREVICUR ENERGY è autorizzato su: melone, anguria, cetriolo, zucchini

REQUIEM PRIME è autorizzato su: cetriolo, cetriolino, zucchini, zucca, melone (solo serra)

SERENADE ASO è autorizzato su: cetriolo (solo serra)

SIVANTO PRIME è autorizzato su: cetriolo, zucchini, zucca, anguria (solo serra)

SONATA è autorizzato su: cetriolo, zucchini, zucca, anguria, melone

TELDOR PLUS è autorizzato su: cetriolo, zucchini

VELUM PRIME è autorizzato su: cetriolo, cetriolino, zucchini, zucca, anguria e melone

VOLARE è autorizzato su: melone, anguria, cetriolo, zucca

Come introdurre i prodotti nella botte in 10 mosse

In caso di miscele di più agrofarmaci, la corretta sequenza di introduzione dei formulati è la seguente e il rispetto di queste semplici regole determina l'ottenimento dei migliori risultati tecnici e permette di evitare spiacevoli inconvenienti in questa fase.

Segui bene le indicazioni per evitare problemi di miscelazione

Bagnanti/fertilizzanti

10

Formulati concentrati emulsionabili EC

08

Emulsioni in sospensione SE

06

Formulati in polvere WP

04

Prodotti contenuti in sacchetti idrosolubili

02

Prodotti liquidi solubili SL

09

Emulsioni in acqua EW

07

Sospensioni concentrate SC

05

Prodotti micro-granulari WG

03

Correttore di acidità

01

Un consiglio:

leggi sempre bene l'etichetta dei prodotti agrofarmaci che devono essere impiegati e verifica eventuali incompatibilità.

Agrofarmaci per le cucurbitacee

Si rimanda all'etichetta dei prodotti per i dettagli delle specie autorizzate.

PRODOTTO	CATEGORIA	COMPOSIZIONE	TEMPO CARENZA gg
Aliette	Fungicidi	Fosetil AI 80%	3
BioAct Prime	Insetticidi	<i>Paecilomyces Lilacynus</i> Ceppo 251 216 g/L	-
Bolikel XP	Vari	Ferro (Fe) chelato 6% Ferro (Fe) chelato con HBED 6% [in pos. ortho-ortho 100%]	-
Contans WG	Fungicidi	<i>Coniothyrium minitans</i> 5%	-
Cupravit 35 WG	Fungicidi	Rame metallo 35%	3
Cupravit Bio Advanced	Fungicidi	Rame metallo 30%	7
Cupravit Blu 35 WG	Fungicidi	Rame metallo 35%	3
Decis Evo	Insetticidi	Deltametrina 2,42%	7
Flint	Fungicidi	Trifloxystrobin 50%	3
Flint Max	Fungicidi	Trifloxystrobin 25% Tebuconazolo 50%	3
Flipper	Insetticidi	Sali potassici di acidi grassi (C14-C20) 47,8%	-
Folicur Combi WG	Fungicidi	Tebuconazolo 4,5% Zolfo 70%	7
Folicur WG	Fungicidi	Tebuconazolo 25%	7
Movento 48 SC	Insetticidi	Spirotetramat 4,53 %	3
Oberon	Insetticidi	Spirotetramat 22,9 %	3 in serra
Previcur Energy	Fungicidi	Propamocarb 47,2% Fosetil 27,6%	-
Requiem Prime	Insetticidi	Terpenoid Blend QRD 460 16,75 %	-
R6 Erresei Bordeaux WG	Fungicidi	Fosetil AI 20% Rame metallo 15%	15

PRODOTTO	CATEGORIA	COMPOSIZIONE	TEMPO CARENZA gg
Serenade ASO	Fungicidi	<i>Bacillus Subtilis</i> Ceppo QST 713 1,34%	-
Sonata	Fungicidi	<i>Bacillus Pumilus</i> Ceppo QST 2808 1,38%	-
Teldor Plus	Fungicidi	Fenexamid 42,8%	3
Velum Prime	Nematocidi Fungicidi	Fluopyram 34,5%	-
Volare	Fungicidi	Fluopicolide 5,56% Propamocarb idrocloruro 55,56%	3

Appunti



Prodotti fitosanitari autorizzati dal Ministero della Salute; per relativa composizione e numero di registrazione si rinvia al sito internet o all'etichetta dei prodotti. Usare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta, prestando attenzione alle frasi e ai simboli di pericolo e alle informazioni sul prodotto.

Edizione 2020

Le informazioni contenute in questo stampato sono redatte sulla base di approfondite sperimentazioni ma si intendono fornite a semplice titolo indicativo, poiché l'impiego dei prodotti è al di là di ogni controllo. Bayer CropScience S.r.l. declina ogni responsabilità per uso improprio dei prodotti o nel caso che i prodotti stessi vengano impiegati in violazione di qualsiasi norma. In ogni caso, per il corretto impiego dei prodotti, si rimanda a quanto riportato in etichetta. Si ringraziano gli autori di *Cultura&Cultura* per alcune delle foto pubblicate.

® Marchio registrato



Bayer CropScience S.r.l.
20156 Milano, Viale Certosa 130 - www.cropscience.bayer.it