



*Tecnologia
innovativa in
ogni goccia*

TELDOR[®]
plus

////////// *Rapido ed
efficace a lungo*

////////// *Ottimo profilo
residuale*

////////// *Resistente al
dilavamento*



*Fungicida antibiotritico
per vite da vino e da tavola,
frutticole e orticole*

La soluzione contro botrite, monilie e sclerotinie

**Protegge attivamente tutte le parti delle
pianta, in campo e in serra!**

Applicabile sia su colture **frutticole** che **orticole**

Elevata persistenza d'azione contro
Botrytis cinerea, *Monilia* spp. e *Sclerotinia* spp.

**Ottima resistenza al
dilavamento**, per una migliore
garanzia sull'applicazione

Agisce per contatto **senza
imbrattare e senza lasciare
odori sgradevoli** sulla
vegetazione e sui frutti

Ampia finestra d'azione
che arriva fino a pre-raccolta



Formulazione liquida: *pratica, sicura, efficace...*

**...con un ottimo profilo residuale e tossicologico,
in linea con le esigenze del mercato, che assicura
freschezza e qualità delle produzioni!**



Utilizzabile fino a pochi giorni dalla raccolta



Registrato anche nella fase di post-raccolta
per drupacee e actinidia



Consente produzioni esportabili in tutti
i principali Paesi importatori



Un unico principio attivo con
ottimo profilo residuale

Focus Vite e Frutta

L'alleato contro Botrite e Monilia

Lunga durata di azione

||||| Su vite, se applicato in pre-chiusura grappolo, assicura protezione fino alla raccolta

Sicuro ed efficace

||||| Il favorevole profilo tossicologico consente l'applicazione su frutta anche in pre e post raccolta

Resistenza al dilavamento

||||| Grazie alla capacità di **Teldor Plus** di fissarsi alla frazione cerosa della cuticola

Qualità delle uve

||||| Il prodotto non influenza la maturazione delle uve ed il processo di vinificazione

N.B.: come per tutti i prodotti fungicidi a meccanismo di azione specifico, data la capacità delle specie fungine di sviluppare ceppi a ridotta sensibilità, è consigliabile la miscela o l'alternanza con prodotti a differente meccanismo d'azione.



Focus Orticole

Un'unica soluzione per Botrite e Sclerotinia...

Rapido e sicuro

||||| Assorbimento rapido nello strato ceroso delle superfici vegetali, dove risulta protetto dall'essere dilavato da pioggia o irrigazione

Azione preventiva subito efficace

||||| Risulta immediatamente attivo, impedendo sia la germinazione delle spore che la crescita del micelio

...per produzioni di elevata sanità



Tabella di utilizzo

Trattamenti fogliari

Coltura	Malattia	Dose (L/ha)	Epoca dei trattamenti	Intervallo tra i tratt.	Giorni di carenza	N° max di tratt.
Vite (uva da tavola e da vino)	Botrite	1-1,5	Da fioritura	20	7	2
Pesco, albicocco, susino, ciliegio	Botrite Monilia	1-1,5	In fioritura e pre-raccolta	-	3	4*
Fragola (in pieno campo ed in serra)	Botrite	1-1,5	Da fioritura	10-14	3	3
Pomodoro, melanzana, cetriolo, zucchini (in pieno campo e in serra) e peperone (in serra)	Botrite	1-1,5	Da fioritura	10-14	3	3
Lattughe e insalate (in pieno campo e in serra)	Botrite Sclerotinia	1-1,5	Da sviluppo foglie	10-12	3	2
Erbe fresche e fiori commestibili (in pieno campo e in serra)	Botrite Sclerotinia	1-1,5	Da sviluppo foglie	10-12	3	2
Fagiolino (in serra e in pieno campo)	Botrite Sclerotinia	1,5	Da bottone florale	10-12	3	3
Cipolla (in pieno campo)	Botrite Sclerotinia	1,2	Da sviluppo foglie	10-12	3	3

Dosi calcolate per irroratrici a volume normale e quantitativi di acqua di 1000 L/ha. Nel caso di utilizzo di irroratrici a basso o ultrabasso volume le concentrazioni del prodotto devono essere aumentate, calcolando l'equivalente dosaggio per ettaro.

Trattamenti post-raccolta

Coltura	Malattia	Dose (ml/hl)	Tipologia di applicazione	Giorni dalla commerc.	N° max di tratt.
Actinidia	Botrite	120	Irrorazione o immersione	60	1
Pesco, albicocco, susino	Botrite Monilia	100 (40-100 ml/t di prodotto)	Irrorazione	1	1*
Ciliegio	Botrite Monilia	100	Immersione	1	1*

*È possibile eseguire solo i 4 trattamenti fogliari o in alternativa, un solo trattamento in post-raccolta all'anno.

Scheda tecnica



TELDOR
plus

	Scheda tecnica
Composizione:	Fenexamid 42,7% (= 500 g/L)
Formulazione:	Sospensione concentrata (SC)
Classificazione:	
Registrazione:	N. 13084 del Ministero della Salute del 10.02.2010
Culture autorizzate:	Vite, Pesco, Albicocco, Susino, Ciliegio (applicazioni fogliari e trattamenti in post-raccolta), Fragola, Pomodoro, Melanzana, Cetriolo, Zucchini, Peperone (in serra), Lattughe e insalate (in pieno campo e in serra), Erbe fresche e fiori commestibili (in pieno campo e in serra), Fagiolino (in pieno campo e in serra), Cipolla (in pieno campo), Actinidia (trattamenti in post-raccolta).
Confezioni:	1 L - 5 L





Bayer Crop Science S.r.l.
20156 Milano, Viale Certosa 130

www.cropscience.bayer.it

Prodotto fitosanitario autorizzato dal Ministero della Salute. Usare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta, prestando attenzione alle frasi e ai simboli di pericolo e alle informazioni sul prodotto.

Edizione 2023.

Le informazioni contenute in questo stampato sono redatte sulla base di approfondite sperimentazioni ma si intendono fornite a semplice titolo indicativo, poichè l'impiego dei prodotti è al di là di ogni controllo. Bayer CropScience S.r.l. declina ogni responsabilità per uso improprio dei prodotti o nel caso che i prodotti stessi vengano impiegati in violazione di qualsiasi norma. In ogni caso, per il corretto impiego dei prodotti, si rimanda a quanto riportato in etichetta.

® Marchio registrato



Cod. 89905087



PCF Process Chlorine Free

