

Tuta Pro Press®

Feromone per la lotta biologica alla minatrice fogliare del pomodoro (*Tuta absoluta*) mediante confusione sessuale; a base di (E,Z,Z)-3,8,11-Tetradecatrien-1-yl acetate + (E,Z)-3,8-Tetradecadien-1-yl acetate. **USO IN SERRA**

PRODOTTO CON S.A. EVAPORABILE (VP) per uso professionale

Tuta Pro Press® - Registrazione Ministero della Salute n.17980 del 16 novembre 2022	
COMPOSIZIONE 100 grammi di prodotto contengono:	
(E,Z,Z)-3,8,11-Tetradecatrien-1-yl acetate	g. 2.76
+ (E,Z)-3,8-Tetradecadien-1-yl acetate (3,1%)	g. 0.34
Coformulanti	q.b. a g. 100
M2i Biocontrol	
112 Bureau de la Colline – 92213 Saint Cloud – RCS Nanterre 801069428 - Francia contact@m2i-biocontrol.com Tel : + 33 05 32 09 68 85	
<u>Distribuito da:</u> Bayer CropScience S.r.l. Viale Certosa 130 20156 - Milano Italia Tel. +39 02 39721	
<u>Stabilimenti di produzione:</u> M2i Biocontrol 370 route de Caunezil 46140 Parnac – Francia	
INDICAZIONI DI PERICOLO: H412 - Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata	
CONSIGLI DI PRUDENZA	
PREVENZIONE: P273 Non disperdere nell'ambiente. P280 Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/Proteggere il viso.	
SMALTIMENTO: P501 Smaltire il prodotto/recipiente in accordo alle norme vigenti sui rifiuti pericolosi.	
INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUI PERICOLI: EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.	
Contenuto netto: 250 g, 1 kg, 2kg, 5 kg Lotto N.	

contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

INFORMAZIONI MEDICHE - MISURE DI PRIMO SOCCORSO

Allontanare la persona dalla zona pericolosa.

- In caso di contatto con la pelle: rimuovere gli indumenti contaminati, sciacquare immediatamente e accuratamente la pelle sotto acqua corrente. In caso di irritazione o eruzione cutanea, consultare uno specialista.

- In caso di contatto oculare: sciacquare immediatamente per 15-20 minuti sotto un getto d'acqua con le palpebre aperte. Per essere sicuri che il lavaggio sia completo, le palpebre devono rimanere separate dal bulbo oculare. Togliere le lenti a contatto, se presenti. Consultare uno specialista.

- In caso di inalazione: in caso di disturbi respiratori, contattare immediatamente i servizi di emergenza o un centro antiveleni.

- In caso di ingestione: sciacquare immediatamente la bocca con acqua. Non indurre il vomito senza consultare un medico. Contattare immediatamente i servizi di emergenza o un centro antiveleni.

- In tutti i casi, se i sintomi persistono o in caso di malore, consultare un medico e mostrare l'etichetta e/o la scheda di sicurezza.

- In caso di intossicazione animale: contattare un veterinario.

USI AUTORIZZATI E MODALITÀ D'IMPIEGO

Il prodotto può essere impiegato, per uso IN SERRA, a una dose per applicazione compresa tra 1,0 kg/ha e 1,5 kg/ha. La dose approvata è la minima per garantire la più alta efficacia. Tale dose può essere adattata sotto la responsabilità dell'utilizzatore all'interno del range approvato, ma l'adattamento della dose non comporta un aumento del numero massimo di applicazioni o la riduzione dei tempi di attesa.

Potrà risultare necessario applicare punti di diffusione (gocce gel) aggiuntivi alle pareti laterali della serra, soprattutto se sono aperte o senza protezioni che limitino l'ingresso degli insetti nella serra.

Il prodotto si applica sotto forma di punti di diffusione (gocce gel), depositati mediante applicatore ad aria compressa su supporto inerte (nessun contatto diretto con la vegetazione).

Il posizionamento ideale dei punti di diffusione (gocce gel) prevede che questi siano sfalsati quando disposti in una stessa fila, e alternati tra una fila e l'altra, per consentire la più ampia copertura possibile.

È consentito un massimo di 4 applicazioni per stagione.

Intervallo di rientro in area trattata: non necessario.

EPOCHE, DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO

Colture	Dose per applicazione	Numero massimo di applicazioni	Modalità ed epoca di applicazione
Pomodoro (<i>Solanum lycopersicum</i>)	1.0 kg/ha - 1.5 kg/ha Un punto di diffusione (goccia gel) – circa 1.33-2.00g per 15 m ²	4 Rinnovo delle applicazioni a intervalli di 90-120 giorni, a seconda della temperatura e della pressione dei parassiti	IN SERRA Prima applicazione all'inizio del primo volo (messa a dimora delle piante) Applicazione-possibile fino alla fase BBCH 99 (raccolta)
Peperone e peperoncino (<i>Capsicum annuum</i>)			
Melanzana e pepino (<i>Solanum melongena</i> , <i>Solanum muricatum</i>)			

PRECAUZIONI PER L'IMPIEGO

Il prodotto resta attivo ed efficace per un intervallo che va dai 3 ai 4 mesi, a seconda del periodo di applicazione e della pressione esercitata dai parassiti.

Un rinnovo dell'applicazione dovrebbe essere previsto ogni 90-120 giorni, in modo da coprire l'eventuale rischio di nuove infestazioni garantendo continuità alla protezione.

L'applicazione del prodotto può essere effettuata dalla messa a dimora delle piante fino alla fase BBCH 99 (raccolta). Per questo motivo, nessun intervallo tra l'ultima applicazione e la raccolta è necessario.

In caso di pressione parassitaria molto elevata, si suggerisce l'affiancamento di un trattamento insetticida.

PREPARAZIONE

Il prodotto è una preparazione pronta all'uso. Non diluire in acqua. Si raccomanda l'utilizzo dell'apposito dispositivo di applicazione previsto per questo prodotto.

COMPATIBILITÀ

Il prodotto si impiega da solo.

PROTEZIONE DELL'OPERATORE E DEL LAVORATORE

Durante la manipolazione e l'applicazione di prodotti fitosanitari, se non sono richiesti indumenti protettivi specifici, indossare sempre indumenti protettivi che coprano braccia e gambe, guanti certificati resistenti agli agenti chimici e scarpe o stivali, impermeabili.

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la

STOCCAGGIO DEL PRODOTTO

Conservare il prodotto nel suo imballaggio originale, in un locale adibito allo stoccaggio di prodotti fitosanitari conforme alle norme in vigore, lontano da bevande e alimenti, compresi quelli per animali. Tenere fuori dalla portata di bambini e delle persone non autorizzate. **Tenere al riparo dal gelo e da fonti di calore.** Conservare in luogo ben ventilato.

Tempo di conservazione:

- se il prodotto non è stato aperto: 6 mesi a temperatura ambiente (conservare ad una temperatura compresa tra 4 e 30°C).

È proibito riutilizzare l'imballaggio.

Durante l'utilizzo del prodotto svuotare completamente il sacchetto d'alluminio. Restituire l'imballaggio al distributore o ad un altro servizio di raccolta specifico.

Per lo smaltimento del prodotto inutilizzabile, conservare il prodotto nella sua confezione originale. Contattare il proprio distributore locale o rivolgersi a una società autorizzata per la raccolta e lo smaltimento di prodotti pericolosi.

In caso di sversamento accidentale

Proteggersi (con adeguati DPI) e assicurare l'area.

Avvisare i vigili del fuoco in caso di pericolo immediato per l'ambiente che non è possibile gestire autonomamente. Raccogliere tutto ciò che potrebbe essere entrato in contatto con il prodotto, terreno contaminato incluso. Pulire il sito e le attrezzature utilizzate, avendo cura di contenere gli effluenti generati dall'operazione di pulizia. Smaltirli secondo le normative vigenti.

ATTENZIONE

Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

**NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O
CORSI D'ACQUA**

**OPERARE IN ASSENZA DI VENTO
DA NON VENDERSI SFUSO**

**IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE
ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE**

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO